


KOMPLIKASI

- Tulang : kerusakan pada sendi dan nyeri tulang belakang.
- Otak : meningitis (radang selaput otak).




GANGGUAN LIVER DAN GINJAL

- Efusi pleura (cairan dalam kantong paru).
- Pneumonia (reaksi peradangan hebat di paru-paru, disertai demam, dapat sesak nafas sampai gagal nafas).
- Reaksi akibat pengobatan TBC (hipersensitivitas, gangguan fungsi liver).



www.rsindriati.com

- 📷 rs.indriati
- 🏠 rumah sakit indriati
- ✉ rsind@rsindriati.com
- ☎ (0271) 5722 000
(0271) 5722 999 (IGD)
- 📍 Jl. Palem Raya, Grogol,
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552



TBC
TUBERCULOSIS

10/D-3/19-9-2018

**KAMI BEKERJA UNTUK BANGSA INDONESIA
YANG LEBIH SEHAT**



RUMAH SAKIT
INDRIATI
SOLO BARU
SUKOHARJO


TBC (Tuberkulosis)

adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Bakteri ini terutama menyerang paru-paru, namun dapat juga menginfeksi organ lain seperti usus, tulang, kelenjar getah bening.

Penyebaran TBC

- Menular melalui saluran nafas, bisa dari droplet cairan ludah atau dahak.
- Kontak lama dengan penderita TBC paru.
- Kuman TBC dapat bertahan lama di ruangan yang gelap dan lembab.
- Kuman TBC lebih cepat menular pada orang dengan gizi jelek dan kekebalan tubuh jelek (misalnya pada penderita kencing manis dan HIV/AIDS).
- Lebih cepat menular pada bayi/anak yang tidak diimunisasi BCG.

TUBERCULOSIS



Gejala—gejala TBC

1. Batuk-batuk (terkadang disertai darah) yang berlangsung selama lebih dari 3 minggu.
2. Keinginan makan dan berat badan turun.
3. Demam yang disertai dengan keringat dan biasanya terjadi pada malam hari.
4. Kondisi fisik semakin lemah disertai perasaan yang tidak enak.
5. Sesak nafas jika yang terjadi infeksi pada bagian bronkus. Hal ini terjadi akibat tekanan dari kelenjar getah bening.

Sign & Symptoms of TUBERCULOSIS



Batuk Berdarah



Demam



Nyeri Dada



Meriang



Turun Berat Badan



Berkeringat di Malam Hari



Batuk Berkepanjangan



Tidak selera makan



Kelelahan

Apa yang perlu dilakukan bila ada keluarga yang dicurigai menderita TBC?

- Ajak pasien memeriksakan kesehatannya ke tempat pelayanan kesehatan.
- Kepastian diagnosa TBC paru dilakukan dengan pemeriksaan foto rontgen dada dan pemeriksaan dahak 3x (pagi, sewaktu, pagi).
- Pada anak-anak, diagnosa TBC dilakukan dengan sistem skoring (penilaian), tanyakanlah pada dokter anak yang memeriksa.

PENATALAKSANAAN

- Jika sudah ditegakkan diagnosis TBC, ikuti program pemberantasan TBC dengan obat yang telah disediakan oleh pemerintah melalui puskesmas.
- Jangan memutuskan obat sebelum dianjurkan oleh petugas kesehatan karena akan menyebabkan kuman kebal terhadap obat TBC.
- Jaga kebersihan kamar dan rumah secara keseluruhan.
- Perhatikan ventilasi kamar cukup untuk pertukaran udara dan cahaya.
- Sediakan tempat penampungan dahak bagi pasien.
- Pastikan setiap batuk pasien menutup mulutnya dengan masker atau sapu tangan.
- Disarankan pasien tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang sehat, terutama anak-anak.
- Pastikan pasien mengkonsumsi makanan yang cukup gizi.