

Apakan pasien dapat melihat lagi?

Pada tipe arteritik dapat terjadi kehilangan penglihatan yang permanen walau jarang terjadi. Pengobatan steroid secara cepat berpengaruh terhadap kesembuhan yang ditandai dengan peningkatan penglihatan. Pada tipe yang non-arteritik hampir semua pasien tidak mengalami kehilangan penglihatan, bila terjadi dapat berlangsung dalam 6 minggu.



Bagaimana stroke mata bisa terjadi?

Stroke mata atau istilah kedokterannya adalah ischemic optic neuropathy terjadi apabila terdapat sumbatan pembuluh darah di belakang bola mata, kehilangan penglihatan dapat terjadi karena aliran darah di retina dan saraf optik terganggu. Seberapa besar kehilangan penglihatan tergantung dari banyaknya retina atau saraf optik yang terkena.



www.rsindriati.com



rs.indriati



rumah sakit indriati



rsind@rsindriati.com



(0271) 5722 000

(0271) 5722 999 (IGD)



Jl. Palem Raya, Grogol,
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552



**GANGGUAN PADA
MATA**

18/D-5/23-7-2020

**KAMI BEKERJA UNTUK BANGSA INDONESIA
YANG LEBIH SEHAT**



RUMAH SAKIT

INDRIATI

SOLO BARU
SUKOHARJO

KAPAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN MATA BAGI ANAK?

- Bayi baru lahir.
- Bayi prematur.
- Anak-anak usia 1-3 tahun.
- Anak-anak usia 3 tahun keatas.
- Anak-anak yang memakai kacamata / lensa kontak.

GEJALA GANGGUAN PENGLIHATAN PADA ANAK BERUSIA 0-1 TAHUN DAN 1-3 TAHUN :

- Tidak memberi respon terhadap cahaya.
- Sering mengucek mata dan berkedip.
- Mata merah dan sering berair.
- Pupil berwarna putih.

SEMENTARA PADA ANAK USIA DI ATAS 3 TAHUN, GEJALA YANG MUNCUL ANTARA LAIN :

- Kesulitan membaca atau melihat objek jarak jauh.
- Mata juling.
- Kurang perhatian atau tidak fokus.
- Kurang koordinasi antara mata, tangan dan badan.
- Sering mengeluh sakit kepala.
- Mata sering merasa lelah dan cenderung memeringkan kepala saat melihat sesuatu.


Pterygium (Selaput pada Mata)

Apa itu Pterygium?

Pterygium adalah kondisi mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput yang menutupi bagian putih pada bola mata. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu atau kedua mata sekaligus.

Gejala-gejala Pterygium

- Mata merah, iritasi, gatal, atau perih pada mata.
- Mata terasa mengganjal.
- Pandangan samar/kabur.



Penyebab Pterygium

Penderita pterygium sering terjadi pada mereka yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Paparan sinar matahari, debu, asap, serta angin diduga berpotensi meningkatkan risiko pterygium. Mata yang kering juga diduga bisa menjadi faktor pemicu.


Bagaimana cara menghilangkannya?

Dengan operasi, jika sudah menimbulkan ketidaknyamanan, penurunan penglihatan, dan mengganggu kosmetik.

STROKE MATA

Apakah stroke mata itu?

Stroke mata merupakan kerusakan saraf mata (saraf optik) yang umum dijumpai pada pasien berumur diatas 50 tahun, yang disebabkan menurunnya pasokan oksigen dan nutrisi ke saraf tersebut.



APA GEJALA-GEJALANYA?

Gejala utamanya adalah penurunan penglihatan mendadak tanpa rasa nyeri dan mata merah. Selain itu juga dapat disertai sakit saat mengunyah makanan, sakit kepala, kekakuan serta tidak dijumpai pulsasi arteri temporal, kepala, malaise, anoreksia, penurunan berat badan, nyeri otot dan sendi (tipe arteritik).

